

## АУТИЗМ СПЕКТРІНІҢ БҰЗЫЛЫСЫ ЖӘНЕ РЕЦЕПТИВТІ СӨЙЛЕУ БҰЗЫЛЫСТАРЫ. ЕРЕКШЕЛІК ӨЛШЕМДЕРІ.

Балалардағы даму бұзылыстарына сарамалы диагностика жасаудың өзекті мәселесі «сенсорлық /сенсор-моторлы алалия» деген атпен белгілі рецептивтік сөйлеу бұзылыстарынан (РСБ) аутизм спектрінің бұзылуының шегін ажырату болып табылады, онда көбінесе қайтарымды сөйлеуді түсінуден зардап шегеді. Төменде осы күйдің кейбір ерекше өлшемдері берілген.

### 1. Сөйлеуді түсіну.

АСБ: біркелкі емес, баланың ерекше мүдделеріне байланысты жағдайларда жақсы көрінеді.

РСБ: тұрақты бұзылған, сөзбен назар аударуды көрнекі түрде күшейту арқылы жеңілдетілуі мүмкін.

### 2. Сөйлеуге назар аудару.

АСБ: қатынас қажеттілігінің төмендеуіне байланысты жеткіліксіз.

РСБ: тұрақты түрде төмендеген, дене шаршауы және сыртқы сөйлеу жүктемесіне қарай нашарлайды.

### 3. Эхолалия (басқалардан кейін сөздер мен сөз тіркестерін қайталау).

АСБ: айту түпнұсқаға жақын.

РСБ: қайта айту кезінде дыбыстың нашарлауы тән.

### 4. Қайталанатын мінез-құлық.

АСБ: тұрақты тұтас сипатқа ие.

РСБ: тұрақсыз фрагменттік сипатқа ие.

### 5. Сөйлеудің даму динамикасы.

АСБ: әлеуметтік-қатынастық қабілетсіздік сақталған кезде сөздік пен қол жетімді командалар ауқымын біртіндеп кеңейту.

РСБ: сөздікті баяу толтыру, сөз «орамын» қолдану, жаңа сөздер мен сөз тіркестерін қабылдаудағы тұрақты қиындықтар.

Бұл бұзылыстардың ең тиімді диагностикасы медициналық және психологиялық-педагогикалық сала мамандары баланың жағдайын кешенді бағалау арқылы ПМПК жағдайында жүргізілуі мүмкін.

